# 增加感染风险的《5种情况》

# 情况 ①

# 饮酒的社交聚会

- 社交聚会时饮酒在带动情绪的同时, 也会降 低注意力, 使听力变迟钝, 致使对话时需要提 高音量。
- 很多人长时间呆在一个狭小的空间里会增加 感染的风险。
- 此外, 共同使用杯子和筷子也会增加感染的 风险。



# 情况② 多人长时间聚餐

- 与短时聚餐相比,长时间的餐、深夜变换场地饮 酒都会增加感染的风险。
- 一大群人(例如5人或更多的人)共同用餐饮酒 会增加感染的风险,因为在多人之间需要大声说话, 唾液飞沫传播更频繁。

### 情况 ③

### 不戴口罩的对话

- 不戴口罩近距离交谈会增加空气传播或微小 飞沫感染的风险。
- 曾经发生过在卡拉OK聚会期间因为没有戴口 罩而感染的病例。
- 开车或乘坐公共汽车时也要小心。



# 在狭小的空间里一起生活

- 在狭小的空间里共同生活因长时间共享封闭空 间会增加感染的风险。
- 曾有报道称感染可能是在公用空间里发生的, 例如宿舍的房间和浴室。



## 情况 ⑤

# **身**处环境的改变

- 在工作间歇的休息时间,精神松懈下来,改变 所在环境感染的风险可能会增加。
- 在休息室、吸烟场地和更衣室里都曾发现过疑 似的感染事件。

