

## ポリオ（急性灰白髄炎）予防接種における 新型インフルエンザ感染拡大防止について

平成21年10月

新型インフルエンザが流行しています。  
ポリオ予防接種の会場には、多くの小さいお子様が  
集まりますので、感染拡大防止のため、ご協力をお願い  
いたします。

●ご来場の際には、必要に応じて、マスクの着用、うがい・手洗い等、  
感染防止にご注意ください。

●保護者、お子様とも、必ずご自宅で検温をしていただき、37.5℃以  
上の発熱や、咳・のどの痛みなどの症状がある場合は、ご来場をお控  
えくださるようお願いいたします。

●発熱や咳、のどの痛みなどインフルエンザ様症状のある方の付き添  
いはご兄弟も含め、ご遠慮いただきますようお願いいたします。

- ・ポリオの予防接種は、標準接種年齢が3か月から1歳半までですが、90か  
月（7歳半）未満までは、無料で受けることができます。
- ・2回接種することにより、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型の3タイプのポリオウイルスに対する免  
疫が付きまます。間隔については、間があいても特に問題はありません。

- ・ポリオの予防接種を受けたあとに他のワクチン（新型インフルエンザワクチン  
を含む。）の接種を受けるには、27日以上の間隔をあける必要があります。
- ・新型インフルエンザワクチンの接種については、現在準備を進めており、そ  
の都度、広報して参ります。

厚生労働省のQ&Aをご参照ください。

<http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/infu091002-01.pdf>