


感染性胃腸炎に引き続き注意しましょう。

- ◇ 第 2 週(2014 年 1 月 6 日～12 日)の定点※あたりの報告数が警報解除基準値(定点あたり 12.00)を下回りましたが、依然として保育園、小学校、高齢者施設等での集団感染の報告が続いています。
- ◇ 感染性胃腸炎は、**ノロウイルス**などの感染が原因で、下痢、腹痛、吐気、嘔吐などを主症状とする冬季に流行する疾患です。
- ◇ 予防には**手洗い**や、**便や吐物の適切な処理**と**次亜塩素酸ナトリウムを用いた消毒**、**食品の十分な加熱**が重要です。

※定点・・・定期的に患者発生状況を報告していただいている医療機関(市内約 90 か所)を定点医療機関といい、そこから報告された 1 週間分の患者数の平均値が定点あたり報告数です。

感染性胃腸炎患者発生状況(感染症発生動向調査)

第 2 週の定点あたりの報告数は 11.31 と、警報解除基準値を下回りました。区別では港南区 21.80、都筑区 16.67、神奈川区 16.33、磯子区 12.50、戸塚区 12.00、栄区 12.00 など依然として報告が多い状態が続いています。(注:第 1 週(2013.12.30～2014.1.5)は休診の医療機関が多いため、報告数が少なくなっています。)



ノロウイルスの予防方法

- ◆ 予防には手洗い、便や吐物の適切な処理と消毒、食品の十分な加熱が重要です。**ノロウイルスの消毒には次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効です。**
○嘔吐物の処理、消毒方法と次亜塩素酸ナトリウム消毒薬の作り方
- ◆ 患者さんの便や吐物を処理する時は、使い捨て手袋、マスク、エプロンを着用し、処理後は石けんと流水でしっかりと手を洗いましょう。また、吐物の処理に際してノロウイルスが空気中に浮遊する危険があるため、換気が重要です。
- ◆ カキなどの二枚貝等を調理するときは、中心部まで十分に加熱しましょう。(中心部が 85℃～90℃で 90 秒以上の加熱が必要です。)

学校保健安全法での取り扱い

学校保健安全法では、出席停止について特に明確に定められた疾患ではありません。登園・登校は、嘔吐・下痢がおさまるなど、患者さんの体調をもとに医師に相談して判断しましょう。

症状が消失した後も、しばらくは便の中にウイルスが排出される可能性があるため、回復後も手洗いが大切です。