

## 麻疹(はしか)の流行について(2)


2008年1月からの横浜市内の麻疹報告者数は、すでに200人を超えており、約半数が予防接種を受けていません。予防接種が済んでいない方は、早めに接種しましょう！

2008年1月1日から、麻疹は感染症法の5類感染症の全数把握疾患になり、診断した医師すべてに届出が義務づけられました。

横浜市における麻疹患者届出状況(2008年1月1日～2月14日)

### 1. 区別届出数

診断月	鶴見	神奈川	西	中	南	港南	保土ヶ谷	旭	磯子	金沢	港北	緑	青葉	都筑	戸塚	栄	泉	瀬谷	計
1月	5	2	1	11	19	8	10	4	8	16	13	1	4	2	26	13	1	1	145
2月	12	5	2	9	8	9	10	5	6	5	12	2		2	7	11	3	7	115
計	17	7	3	20	27	17	20	9	14	21	25	3	4	4	33	24	4	8	260



### 2. 年齢層別届出数



年齢	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上
届出数	11	10	10	78	69	24	29	14	6	7	2	0

年齢層別届出数

### 3. 予防接種歴

あり	56
なし	130
不明・未記入	74

予防接種歴



詳細は、[http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/eiken/infection\\_inf/2008nen/measles-sokuhou.pdf](http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/eiken/infection_inf/2008nen/measles-sokuhou.pdf) をご覧ください。

全国および横浜市近隣の麻疹患者届出数(2008年第1週～第6週・2月14日現在)

	第1週 (1/1～1/6)	第2週 (1/7～1/13)	第3週 (1/14～1/20)	第4週 (1/21～1/27)	第5週 (1/28～2/3)	第6週 (2/4～2/10)	累積 (1/1～2/10)
全国	85	151	240	267	503	351	1597
埼玉県	2	3	1	4	17	18	45
千葉県	2	8	2	4	11	12	39
東京都	10	13	24	22	38	27	134
神奈川県	40	59	95	106	174	147	621
横浜市	17	20	38	37	51	53	216
川崎市	1	7	2	9	7	8	34
県域(横浜、川崎除く)	22	32	55	60	116	86	371
横須賀市	14	21	40	46	64	57	242

< 注意！ >

発疹を伴う発熱など、麻疹が疑われる症状があるときや、周囲に麻疹の患者がいて、発熱など感染の可能性があるときは、あらかじめ連絡してから、早めに医療機関を受診しましょう。  
その場合は、登校や外出は避けましょう。

< 医療機関を受診する時 >

**必ず事前に電話で以下の事項を伝えて、受診の仕方(時間の指定、待合室の指定など)を確認しましょう。**

1. 学校、職場、家族等で麻疹の患者が出ている場合は、その詳細
2. ご自分の症状と、予防接種歴

何も連絡せずに受診し、黙って、待合室で他の患者さんと一緒に待つ事がないようにしてください。

< 麻疹について >

麻疹は、空気感染、飛沫感染、接触感染と様々な感染経路を示すウイルス感染症で、**感染力が極めて強力**で、同じ空間を共有することでも感染する場合があります。  
免疫のない人が感染すると、ほぼ100%発病します。

肺炎、脳炎、中耳炎、腸炎等の合併症発症率、入院率が高く、死亡例もあります。

潜伏期は10～12日で、**発熱、咳、鼻水、目の症状、発疹のいずれかが出現する前日から解熱後3日を経過するまで、周囲に感染する可能性があります。** 特異的な治療法はありません。

**唯一の予防方法は、ワクチン接種です！**

< ワクチン接種について >

定期接種対象年齢は、第1期:生後12～24か月未満、第2期:小学校入学前年の4/1～3/31です。

4月からの小学校入学に備え、**第2期の接種を確認しましょう！**

また、4月より5年間、中1及び高3相当の年齢への定期接種が実施される予定です。

< 医療機関の方へ >

麻疹を診断した場合は、なるべく24時間以内に、最寄りの福祉保健センターに届出をお願いいたします。

[届出基準](#) [届出様式](#) [麻疹発生連絡票](#)(\*)

\* 横浜市では、発生届と合わせて「麻疹発生連絡票」のご記入をお願いしております。

< 参考資料 >

- ・ 麻疹(はしか)について  
([http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/eiken/infection\\_inf/measle1.htm](http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/eiken/infection_inf/measle1.htm))
- ・ 麻疹の排除に向けて(横浜市衛生研究所検査情報月報12月号)  
([http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/eiken/inspection\\_inf/200712/measles-haijo.pdf](http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/eiken/inspection_inf/200712/measles-haijo.pdf))
- ・ 2012年麻疹排除に向けて(国立感染症研究所) 届出ガイドライン、対応ガイドライン等も載っています  
(<http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/index.html>)