

歯の健康・食生活

妊娠中はホルモンバランスの変化により、お口の中は普段以上の注意とケアが必要です。また生まれた赤ちゃんも将来、むし歯にならないために歯が生える前から歯みがきに慣れる準備をしていきましょう。また授乳の時期から離乳食へ移行していきます。赤ちゃんの成長に合った食事の摂り方を考え、楽しい食生活を過ごしていきましょう。

妊娠中の歯の健康	64
子どもの歯の健康	66
むし歯にしないために歯みがきレッスン!	68
おやつのとり方を工夫しましょう	69
妊娠さんと子どもの歯に関するよくある質問	70
ママと子どもの食生活	72
離乳食のすすめ方	74
幼児期の楽しい食事	76



妊娠中の歯の健康 さわやか歯ハ・ライフ

妊娠中の口の中の変化

妊娠すると、こんなことありませんか？

- 口臭が気になる。
- 歯肉が腫れた
- 歯をみがくと
- つわりで歯が
- 口の中がねばねばする。
- 感じがする。
- 血が出る。
- みがけない。



一般的に、妊娠すると口の中の環境が悪くなり、むし歯や歯周病が増えると言われます。妊娠中に歯周病が重症化すると、早産や低体重児出産に影響を及ぼす可能性も報告されています。

原因

1. つわりで歯みがきが十分にできない。
2. 食事や間食回数が増え、食生活が不規則になる。
3. 唾液のpHの低下（唾液の酸性化）や、内分泌機能が変化する。

妊娠中に起こりやすい歯と口の病気



上の2枚と
比べてください

妊娠中のむし歯の予防や歯周病の予防・改善

1 まず、むし歯や歯周病の原因は歯垢（プラーカー）です

歯垢（プラーカー）とは…？

- 成分のほとんどが細菌で、食べカスではありません。
- 歯垢は、食べ物や飲み物に含まれる糖分を栄養にして生産され、増えています。
- ねばねばした汚れで、口をゆすりただけでは取れません。
- むし歯や歯周病の原因になるものです。



これが歯垢（プラーカー）です!
時間とともに細菌が増えます



2 歯みがきや食生活で、お口の中の環境を良くして歯垢をなくす!

具体的には


歯みがきで歯垢をとりましょう。
腫れていた歯肉も改善されます。

間食については


甘い食べ物や、糖分の含まれる飲み物は控えめにして、牛乳・乳製品や果物などを取りましょう。

歯ブラシ以外の道具

デンタルフロス



歯間ブラシ



歯ブラシが届かないところは、フロスや歯間ブラシ等を使います。

かかりつけの歯医者さんをつくりましょう!

妊娠期からの歯と口の健康管理が大切です。かかりつけ歯科医で定期的にお口の中のチェックやブラッシングアドバイスを受けましょう。

赤ちゃんの歯がつくられるまで

妊娠 8 週頃

乳歯の芽



かわいらしい歯が
生えてきました。

乳歯の芽は妊娠8週頃にでき始め、妊娠中期になると永久歯の一部もつくられ始めます。

妊娠 5~6 か月頃

永久歯の芽の
一部がつくられる



かわいらしい歯が
生えてきました。

乳歯の芽は妊娠8週頃にでき始め、妊娠中期になると永久歯の一部もつくられ始めます。

6~7 か月児

歯肉をつきやぶって
乳歯の誕生



かわいらしい歯が
生えてきました。

乳歯の芽は妊娠8週頃にでき始め、妊娠中期になると永久歯の一部もつくられ始めます。

赤ちゃんの歯を守るために

赤ちゃんはむし歯菌を持たずに生まれてきます。
むし歯菌は、周囲の人から唾液を介してうつります。


周囲の大人の方はむし歯の治療や歯みがきをして、常に口の中を清潔に保ちましょう。

赤ちゃんが生まれたら、早い時期から甘いお菓子や飲み物を与えないでね!
むし歯菌（ミュータンス菌）は糖分を摂取して増えています。赤ちゃんに早い時期から甘い物を覚えさせないようにしましょう。

歯みがきのポイント

みがき方

歯垢は、歯ブラシの毛先を上手に使って軽くこきざみに動かすとよくとれます。



歯ブラシの選び方

- 植毛部は小さめ
- まっすぐな柄
- 平坦な毛のカット



歯みがき剤

汚れを落とす補助剤の1つです。

これからママになる方へ

妊婦歯科健診を受けましょう!

妊婦歯科健診を受けるには

横浜市民の妊婦さんを対象に、妊婦歯科健診を実施しています。

妊婦歯科受診券の利用で、市内の「妊婦歯科健康診査実施医療機関」で妊娠中に1回、無料で健診が受けられます。できるだけ、妊娠12週から27週頃に受診しましょう。

名簿は、こども青少年局ホームページ、区福祉保健センターで閲覧できます。受診の前に必ず歯科医院に予約をしてください。

当日の持ち物

- ・母子健康手帳
- ・受診券
- ・産婦人科の診察券

パパや家族になるみなさんへ

この機会に、ママと一緒に歯科健診を受け、家族で健康づくりを始めてみませんか!妊娠期からの歯と口の健康管理が大切です。かかりつけ歯科医で定期的にお口の中のチェックやブラッシングアドバイスを受けましょう。

子どもの歯の健康

じょうぶな歯で、よくかんで食べることは、健康な体をつくるうえで、とても大切なことです。生えた歯は、大切にしましょう！

歯は生えてきましたか？

生えた乳歯の大切な役割は

- 食べ物をかむ
- 発音を助ける
- 顔の形をととのえる
- 永久歯が正しく生えかわるときの場所の目印

歯みがきの準備をはじめましょう！

- ほっぺやお口の周りを触ったりして、触られてもいい感覚に慣れさせましょう！
- 何でも口に入れたがるこの時期に、大人の目が届くところで、歯ブラシを持たせて慣れさせましょう。

乳歯列完成ドキュメント！

あっ！歯が生えてきた

乳歯は、生後約6か月～10か月頃に生えてくると言われていますが、個人差があります。

どんどん生えてくるね

前歯は、6～7歳頃まで使うよ！

奥歯の登場！

奥歯は、10～12歳頃まで使うよ！

ヤッター、乳歯列の完成

乳歯は、上下合わせて20本生えてきます。

あっこれは…
むし歯！

むし歯のなり始め

毎日のチェックで早めに発見

むし歯ができちゃった

むし歯になりやすい場所


子どものむし歯

- 1歳6か月で、むし歯のある子は約0.6%で、3歳になると、なんと約5.1%に増えます。

1歳6か月 約0.6%
3歳 約5.1%

(令和5年横浜市乳幼児健診)


経年的むし歯罹患率



むし歯は、年々減少傾向にあります。グラフのように、1歳6か月児から3歳までに約10倍にむし歯にかかるお子さんが増えています。歯みがき習慣、おやつの取りかたなど注意しましょう。また、かかりつけ歯科医で定期的に歯科健診をうけましょう。

むし歯ができるしくみ

その細菌が、口の中にはいった糖質を食べて、これを、そのままにしておくと…



お口の中にはいつもたくさんの細菌がいます。

ミュータンス菌など

歯垢というネバネバした物質をつくります。

これが、むし歯です！



細菌が、歯垢の中で酸をつくり、歯を溶かしてしまいます。

見た目にはきれいですが…



きれいに見えても、歯垢染色液で染め出してみると、歯垢が残っているところが赤く染まります。この歯垢（プラーカー）がむし歯の原因です。

子ども自身でみがけたつもりでも、こんなにみがき残しがあります。仕上げは、大人がしてあげましょう。


むし歯にならないために 歯みがきレッスン！



歯ブラシの選び方

子ども用

毛の部分は、子どもの前歯2本分ぐらいの大きさで、柄が短く太いものが良いでしょう。



仕上げ用

大人が握りやすい、柄の長いものが良いでしょう。



仕上げみがきの歯ブラシの持ち方

ペンを持つ要領で、軽く持ちましょう。



事故予防

歯ブラシによる事故が多いのは1歳児で、その7~8割は歯みがき中の転倒事故です。親の目の届かないところで決して歯ブラシを持たせないようにしましょう！

仕上げみがきの姿勢

口の中がよく見えて、仕上げみがきがしやすいのは寝かせた姿勢です。

しかし、寝かせみがきを嫌がるお子さんには、座らせたり、立たせて後ろから支える方法もあります。

お子さんに合った方法でみがきましょう。

寝かせみがきです



仕上げみがきの歯ブラシの動かし方

歯ブラシを歯面に直角に当て、軽く横にシャカシャカと動かしましょう。



座らせてみがく方法です




立たせてみがく方法です



部位別みがき方


前歯（表側）

歯の表面に毛先を直角に当てて、軽く横にシャカシャカと動かします。



前歯（裏側）

歯ブラシをたてに入れ、かき出すように動かします。



奥歯のかみ合わせ

溝に毛先を直角に当てて、細かく動かします。



おやつのとり方を工夫しましょう

おやつは幼児にとって、食事の一部でもあります。楽しみでもあります。だけどむし歯にはしたくない！食べ方を工夫して歯を健康に保ちましょう。

おやつのキーポイント

1 時間を決めましょう。



2 おやつは、3回の食事で足りない分を、おやつとして補いましょう。 組み合わせや量を考えましょう。




3 お菓子・ジュースの 買いおきは やめましょう。




1日の砂糖のめやす P.77 参照

1~5歳 5g
5gのスティックシュガー
1本分



お菓子などをダラダラと食べるのやめましょう

食後は口の中が酸性になります、pHが約5.5（臨界pH）以下になると歯の成分が溶けだします（脱灰）。その後、唾液が溶けた歯を修復してくれます（再石灰化）。お菓子などをダラダラ食べると、口の中がいつまでも酸性で、再石灰化が間に合わず、むし歯になります。



◆ 食事やおやつを食べるとpHが低下し、歯の成分が溶け出します。30分ほど経過すると、唾液が中和してpHが上昇し、唾液が歯を修復します。

◆ 間食（ビスケット、あめ、ケーキ、ジュースなど）をとるたびにpHが低下し、常に口の中が酸性状態になり、再石灰化が間に合わないと、むし歯になります。

お砂糖にかえると、このくらいの甘さ？

これは一般的な目安です。栄養成分表示が書かれているものもありますので参考にしましょう。

飲み物	
炭酸飲料 500ml	50g
イオン飲料 500ml	35g
乳酸飲料 65ml	12g
果物ジュース 200ml	20g

お菓子類	
ドーナツ 40g	10g
プリン 1個	20g
ヨーグルト 1個	10g
アイスクリーム 1個	24g
ショートケーキ 100g	30g
氷菓子 1本	18g
チョコレート 1枚	25g
グミ 3個	20g

妊婦さんと子どもの歯に関するよく

ある質問

妊婦編

Q 歯の強い子にしたいのですが、妊娠中にカルシウムをとると強い歯ができますか？
A カルシウムだけではできません。タンパク質やミネラルや、リン、ビタミンなどバランスのとれた栄養が必要です。

Q つわりで歯みがきができません…
A 気分の良い時にこまめにみがいたり、小さめの歯ブラシで下を向いてみがくとよいでしょう。歯みがき剤の香りが気になる場合は歯ブラシだけで十分です。

乳幼児編 (参考: すぐに役立つ 歯育て支援 Q & A より)

Q 上唇から前歯の根元の歯ぐきのところに筋みたいなものがのびているのですが？
A 子どもの上唇の裏には、上唇小帯といいます。ここに歯ブラシの毛や柄の先が当たると痛みを感じます。小帯を保護するように指でカバーしてみがきましょう。



Q 歯が生まれつき生えているのですが…
A 生まれたときすでに歯が生えていたり(先天性歯)、生後まもなく歯が生え始めることがあります。下の前歯によく見られますが、歯ぐきを傷つけたりすることもあります。歯科医院で相談しましょう。

Q 歯が生える前のきざしはありますか？
A しきりにものを口へ運んで噛もうとする動作が増えてきます。

Q 仕上げみがきを嫌がるのですが…
A 歯ブラシだけでなく、顔やお口のまわりにふれスキンシップをとりましょう。そして、歯みがきをするとお口の中がきれいになるということを体験させてあげましょう。無理をせず、歌いながらなど楽しい雰囲気で、短時間で済ませましょう。

Q お誕生日を過ぎても歯が生えないのですが…
A 1歳3か月頃になってもまだ生えてこないような、歯科医院で相談しましょう。

Q 歯をみがくと出血します。どうしたらよいでしょうか？
A 出血の原因は、歯垢による歯肉炎と思われます。特に歯と歯肉の境目の部分にみがき残しがないよう気をつけましょう。

Q 歯の治療はどうしたらよいでしょうか？
A 一般的には、定期検査(妊娠16週～27週)にほとんどの歯の治療は可能です。その他の時期でも、お母さんの体の状態や治療内容によって可能です。まず、主治医と歯科医師に相談しましょう。

Q 転倒して歯をぶつけてしまったのですがどうしたらよいでしょうか？
A ごく軽い場合には様子を見てもよいですが、かかりつけ医に診察してもらってください。また、子どもに歯ブラシを持たせるときは、必ず保護者の見守りが必要です。歯ブラシを持ったまま歩くことは、非常に危険ですので注意しましょう。

Q 歯が2本くつついで生えてきました。むし歯になりやすいでしょうか？
A 痛合歯といいます。2本の歯が一体化している状態です。2本が合わさっている部分は溝になっていることが多い、その部分はむし歯になりやすいので、よくみがいてください。溝が深い場合は、予防的に溝を埋めるほうが望ましい場合もありますのでご相談ください。

Q おしゃぶりはいつごろまで使っていいですか？
A 離乳が完了して口の働きが「吸う」から「かむ」ことに移行します。2歳を過ぎても使用を続けると、歯並びやかみ合せに影響がでやすくなります。2歳過ぎまでにはやめられるといいですね。

Q デンタルフロスを使うと、「すきっ歯」になりますか？
A デンタルフロスで隙間が開くことはありません。むしろ、歯ブラシだけでは、歯と歯の間の汚れを落とすことが難しいので、積極的に使うことをお勧めします。

Q 歯ぐきに真珠のような白いものが見られますか？
A 生後2～3か月のころに歯ぐきに白い半球状の粒が見られることがあります。これを上皮真珠といいます。歯をつくる細胞の一部が残って硬くなったりです。自然になくなりますので心配ありません。

Q 子どもに歯ブラシを持たせる時期はいつ頃からですか？

A 離乳食も始まり手に持ったものをお口の中に入れるようになら歯ブラシを持たせてあげましょう。危ないので大人は目を離さないように注意しましょう。

Q 歯と歯のすき間が気になるのですが…

A 乳歯の歯並びではすき間があっても正常です。成長とともにあごは大きくなります。成長したあごにちょうどよい大きさの永久歯に生えかわってすき間はなくなります。

Q かみ合わせが反対なのですが…

A この時期はまだ奥歯が生えていないことも多く、しっかりかみ合っていないのがふつうなのでつきりわかりません。歯科医院にご相談下さい。下あごを前に突き出すような動きは異常ではありません。

Q 指しゃぶりをします。どうしたらよいですか？

A 指しゃぶりは3歳ごろまでは、無理にやめさせなくてもいいでしょう。お子さんの生活リズムを整え、元気に外遊びをさせたり、手や口を使う機会を増やしましょう。寝付くまでの間は、子どもの手を握ったり、絵本を読んであげたりしましょう。4歳以降も続くようなら、小児科医や小児歯科医などの専門家に相談しましょう。

Q 歯が足りないといわれましたが…

A 先天欠如といって、もともと歯がつくられないこともあります。また、癒合歯といって、2本分の歯がくつついで生えることもあります。乳歯のうちは経過をみて、永久歯に生え変わる頃に、将来の歯並びやかみ合せについて小児歯科医に相談しましょう。

フッ化物について

フッ化物は、歯を強くしたり、初期むし歯の修復(再石灰化)を促し、むし歯になりにくい歯を作る効果があるといわれています。

フッ化物は、むし歯予防の万能薬ではありません。安心せず、歯みがき習慣や規則正しい食生活を守りましょう。利用の方法としては下記のような方法があります。

①フッ化物入りの歯みがき剤などを家庭で毎日継続して使う方法
◆歯みがき剤の量は、年齢に合った量を使いましょう。

歯みがき剤の使用量の目安

0歳(歯が生えてから)～2歳で、吐き出しやうがいができる乳幼児

米粒程度
(1～2mm程度)



3歳～5歳で吐き出しやうがいができる乳幼児

グリーンピース程度
(5mm程度)



6歳～14歳

歯ブラシ全体
(1.5cm程度)



◆歯みがき剤は、使用説明にそって使いましょう！

②フッ化物洗口による洗口方法

4歳以上でうがいができる場合は、フッ化物の洗口液でうがいする方法もあります。詳しくは、かかりつけ歯科医に相談しましょう。

③歯科医院で定期的に塗布する方法

歯みがき剤やフッ化物洗口液よりも濃度の高いフッ化物を、定期的に歯科医院で塗布する方法があります。希望される場合は、かかりつけ歯科医に相談しましょう。



乳幼児歯科相談&妊産婦歯科相談のごあんない

各区福祉保健センターにおいて乳幼児及び妊産婦を対象に歯科相談を実施しています。お子さんの仕上げみがきの方法がよくわからない、歯並びが気になるなど歯のことで心配なことがありますらご相談ください。

また、妊娠すると口の中がネバネバする、つわりで歯みがきができないなどお口の中の変化が見られます。お口に関することで歯科相談をご希望の方は、各区福祉保健センター歯科相談日にご予約ください。歯科医師&歯科衛生士が直接お答えします。

福祉保健センターこども家庭支援課 P.28・29 参照

授乳中のお母さんの食事

- 妊娠中に引き続き、授乳期も母乳を十分に分泌させるためや、お母さんの健康の維持のためにもバランスの良い食事が大切です。(P.40・41参照)
- 食事は1日3回、主食・主菜・副菜をそろえるように心がけましょう。



次の世代に良い食習慣を

- 子どものころの食習慣はその人の一生の健康に大きくかかわるもの1つです。新しく生まれた赤ちゃんに良い食習慣を伝えましょう。
- そのためには、1日の生活リズム(睡眠、食事)を整え、親が好き嫌いなく何でも食べることが必要です。
- 家族そろって楽しい食卓を囲みましょう。



離乳食

離乳食とは

- 離乳食とは、母乳やミルクから幼児食へ移行する食事です。(母乳やミルクを飲む行為は、本能ですが、食物をかみつぶして飲み込むことは学習です。最初から上手に出来ることではありません)赤ちゃんのかむ能力にあわせて離乳食を与えましょう。
- 『食べることは楽しいこと』ということをわかってもらう第一歩です。食事は楽しくあせらず、ゆったりとした雰囲気ですすめましょう。

はじめるにあたってのポイント

- 生活のリズムを整えましょう。
- 昼と夜の区別をつけ、生活のリズムをつけてあげましょう。
- 赤ちゃんには、個人差があります。それぞれの赤ちゃんにあわせてすすめましょう。
- 嫌がるときには無理をせずに声かけをしながら楽しくすすめましょう。
- 赤ちゃんがスプーンを持ちたがったら、柄の短い赤ちゃん用スプーンを使うのもいいでしょう。



離乳食の開始の目安

- 開始時期は一般的に生後5、6か月頃といわれています。以下の様子が見受けられたらそろそろ始めてみましょう。
 - ・首のすわりがしっかりして寝返りができる。
 - ・5秒程度座れる。
 - ・スプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる。
 - ・食べ物に興味を示す。



離乳食のすすめ方 (P.74・75参照)

- 離乳食を始めて1か月間は、あせらずに、離乳食にならしたり、飲み込む練習をしましょう。
- 離乳食の後には母乳・ミルクを与えましょう。
- 母乳の場合
- 子どもの欲するままに与えましょう。
- ミルクの場合
- 離乳初期は子どもの欲するままに与え、離乳中期以降はP.74・75のスケジュール例を参考に与えましょう。
- 食物アレルギーの発症を心配して離乳食の開始を遅らせる必要はありません。

離乳食の完了

- 母乳やミルク以外の、形のある食事がしっかり食べられるようになります。12か月～18か月ごろが目安です。

注意

- 乳児ボツリヌス症予防のために、1歳までは、はちみつを与えないようにしましょう。また、人工乳(粉ミルク)に使う水として、井戸水は使用しないようにしましょう。
- 赤ちゃん自身がアトピー性皮膚炎の場合やきょうだいに明らかな食物アレルギーがある場合は、まずは主治医に相談しましょう。
- 手、食器、調理器具は、清潔にし、新鮮な良い材料を加熱して衛生的に調理しましょう。

ワンポイントアドバイス

最初にあげる「つぶしがゆ」の作り方

炊いたご飯 大さじ2杯分(ピンポン玉大)
+
水 1カップ(200ml)
(水道水・ミネラルウォーター<軟水>)



※炊飯器内の圧力によってはうまくいかない場合があります。耐熱容器の高さ・耐熱温度等にご注意ください。

フリージングを利用して

- 多めに作った場合は、離乳食用の個別保存容器を使って1回分ずつラップなどに分けて冷凍し、早めに使いましょう。



離乳食のすすめ方

赤ちゃんが食べることに興味をしめるように、大人が食事をしている場面を見せるように心がけましょう。

初めてあげる食品は、小さじスプーン1杯程度から始めて、赤ちゃんの様子を見ながらすすめます。

離乳の開始

月齢

離乳初期 5~6か月頃

- ・開始はあせらずに、5、6か月頃から。
- ・新しい食品を加える時には、一品のみを離乳食用のスプーン1杯程度からはじめ、赤ちゃんの様子をみながら増やしていきます。
- ・時間を決めて毎日続けましょう。
- ・野菜などを食べさせると便の中にそのまま出ることがあります。また、便が軟らかくなても赤ちゃんの機嫌が良く、食欲もあれば心配せずにあげましょう。
- ・大人の食事を上手に利用しましょう。(やわらかくした材料を味つけ前に取り分けてすりつぶしましょう)

チェックポイント

離乳中期 7~8か月頃

- ・あせらず、じっくりモグモグの練習をさせてあげましょう。
- ・大人の食事を上手に利用しましょう。(やわらかくした材料を味つけ前にとりわけ食べやすくしましょう)
- ・野菜などを食べさせると便の中にそのまま出ることがあります。また、便が軟らかくなても赤ちゃんの機嫌が良く、食欲もあれば心配せずにあげましょう。

食べ方の発達の目安

ゴックン期

口を開けたまま飲み込むこともあります、だんだんと口を閉じて飲み込むようになります。

モグモグ期

舌と上あごで押しつぶせるようになり、モグモグと口を上下に動かしたあと、飲み込めるようになります。

固さの目安

なめらかにすりつぶした状態 (ヨーグルトぐらい)

	1回	2回
6:00	10:00	14:00
14:00	18:00	22:00
22:00		

1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
2回目	3回目	4回目	5回目	
3回目	4回目	5回目		
4回目	5回目			
5回目				

スケジュール例



1回当たりの目安量	体温をつくり 働く力になるもの	穀類	つぶしがゆか	
			1回目	2回目
I	整える 体の調子を	米	つぶしがゆ ごはんをやわらかく煮てよくつぶす。	
II	野菜 いも 海藻	パン	パンがゆ (両面焼いて細かくくだき、汁やミルクで煮る。)	
III	果物	うどん	やわらか煮をつぶす。	
			スープの実や、やわらか煮をすりつぶす おろし煮など	20~30g
			やわらか煮のつぶしたもの	
			10~15g	新鮮な魚を煮てほぐしたり、すり身にする。
			10~15g	脂肪の少ない肉、レバーをつぶして
			30~40g	汁の実、煮どうふ
			卵黄1個→全卵1/3個	かゆに混ぜたり、かき卵汁、炒り卵などにする。
			50~70g	プレーンヨーグルトや粉チーズ (かゆなどにふりかける)

つぶしがゆから始める。
すりつぶした野菜なども試してみる。
慣れてたら、つぶした豆腐・白身魚・卵黄などを試してみる。
この中から1種類食品は1回に1回まで使用する。

魚
または
肉
または
豆腐
(大豆製品)
または
卵
または
乳製品

血
や
肉
なる
もの

この中から1種類食品は1回に1回まで使用する。

74

月齢	離乳初期 5~6か月頃		離乳中期 7~8か月頃		離乳後期 9~11か月頃		離乳完了期 12~18か月頃	
	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
6:00	10:00	14:00	18:00	22:00	6:00	10:00	14:00	18:00
1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	1回目	2回目	3回目	4回目
2回目	3回目	4回目	5回目		1回目	2回目	3回目	4回目
3回目	4回目	5回目			1回目	2回目	3回目	4回目
4回目	5回目				1回目	2回目	3回目	4回目
5回目					1回目	2回目	3回目	4回目

離乳後期 9~11か月頃

- ・自分で食べたがるようになってきます。うまくできなくて、自分でやらせてあげましょう。
- ・コップの練習を始めましょう。
- ・手づかみ食べしやすいものも用意しましょう。

ワンポイントアドバイス



- ・ほとんどの食品が使えます。主食とおかずにはいろいろな味に慣らしていきましょう。
- ・大人の食事を上手に利用しましょう。
- ・味付けは薄味を心がけましょう。
- ・離乳食を嫌がるときは、無理強いをしないで食事時間を規則正しくしましょう。食べないとお菓子をあげないようにしましょう。



完了

- ・思いきり遊ばせて、食欲がわくようにしましょう。
- ・1日3食、しっかり食べられるようにしましょう。
- ・1日1~2回、食事の一部としておやつをあげましょう。

幼児期の楽しい食事

食事の時間は楽しい時間です。周りの大人がゆったりとした気持ちで子どもと接しましょう。そして、のびのびとした雰囲気で楽しく食べられるように心がけましょう。



栄養のバランス

幼児期では食べる量や発育の状態にかなりの個人差があります。少食でも毎食、**主食+主菜+副菜(野菜)**がそろっていれば、心配いりません。

生活のリズム

起床後すぐや、あまり体を動かさない生活ではお腹もすきません。起床・就寝・食事・遊びの時間等の生活リズムを整えましょう。



1~2歳で気をつける ポイント

- 全部自分で吃るのはむずかしいですが、手づかみなどで少しづつ食べられるようになります。
- 食事の前に手を洗い、手で食べても大丈夫なようにしましょう。



- 奥歯で食物を十分すりつぶせるようになるのは3歳後です。あまり早いうちに硬い物、かみにくい物を与えると、丸呑みをしたり、かむ力が育ちません。食物によっては、子どものちっ事故の原因になります。



3~5歳で気をつける ポイント

- お手伝いを通して「食べること」に興味をもちます。買い物や食事づくりの中で子どもができること(お茶わん等食器をならべる、卵の殻をわる等)を見つけ、一緒にしましょう。また、「お肉は力がつくよ」「野菜は元気のもとよ」と声をかけながら行うことで自然と興味をもてるようになります。



注意!

生や生焼け お肉は 食べさせちゃ ダメ!

お肉には、新鮮でも腸管出血性大腸菌(O157やO111など)や、カンピロバクターなどの菌が付いていることがあります。腹痛・下痢・発熱などを起こす食中毒の原因になります。

乳幼児は抵抗力が弱く重症化しやすいので、要注意です。

- ・お肉は中心の色が変わるまでしっかり加熱!
- ・生肉に触れた箸で食べさせない!
- ・生肉を扱ったまな板・包丁などは洗剤を使って十分に洗浄し、熱湯や消毒剤(塩素系漂白剤でも代用可)で消毒!
- ・生肉にさわったら、ていねいに手洗いし、アルコール等で消毒をする!

1日のたべもののめやす

食べる量には個人差があります。子どもの発育や食欲にあわせて調整しましょう。

働き	食品	子どもの量(1~2歳)	子どもの量(3~5歳)	お母さんの量
血や肉になるもの	卵類 牛乳、乳製品 魚類 肉類 大豆製品	鶏卵 25g (1/2個) 牛乳 250ml (子どものコップ2杯) どちらか 30g とうふ 50g (1/6丁)	鶏卵 25g (1/2個) 牛乳 300ml (子どものコップ2杯) どちらか 40g とうふ 75g (1/4丁)	鶏卵 50g (1個) 牛乳 180ml (コップ1杯) 60g 60g とうふ 100g (1/3丁)
からだの調子を整えるもの	緑や黄色の濃い野菜 その他の野菜 くだもの	90g にんじん 20g かぼちゃ 20g 小松菜 50g (2株) 120g たまねぎ 30g (1/4個) キャベツ 40g (1枚) 150g たまねぎ 30g (1/4個) キャベツ 40g (1枚) 100g みかん 100g (中1個) 150g	90g にんじん 20g かぼちゃ 20g 小松菜 50g (2株) 150g たまねぎ 30g (1/4個) キャベツ 40g (1枚) キウイ 50g (1/2本) レタス 30g (1枚半) みかん 150g (小2個)	120g にんじん 20g かぼちゃ 20g 小松菜 80g (4株) 230g たまねぎ 60g (1/2個) キャベツ 80g (2枚) 200g
体温をつくり働く力となるもの	穀類 いも類 さとう あぶら類 菓子類	ごはん 100g (子ども茶わん1杯) ゆでうどん 120g (1/2玉) 食パン 45g (1枚) じゃがいも 30g (中1/3個) 5g (大さじ1/2) 10g (大さじ1) せんべい 20g (2枚)	ごはん 100g (子ども茶わん1杯) ゆでうどん 160g (2/3玉) 食パン 60g (1枚) じゃがいも 55g (中1/2個) 5g (大さじ1/2) 15g (大さじ1 1/2) せんべい 30g (3枚)	ごはん 250g (茶わん大1杯) ゆでうどん 200g (1玉) 食パン 90g (2枚) じゃがいも 100g (中1個) 10g (大さじ1) 20g (大さじ2) せんべい 40g (4枚)
計	エネルギー	900~950キロカロリー	1250~1300キロカロリー	2000キロカロリー

お・や・つ おやつも食事の仲間です

- 3回の食事ではとりきれない栄養を補うのがおやつです。おやつの例(ホットケーキと牛乳・さつま芋と牛乳・果物と牛乳)
- 食事のほかに1日1~2回、時間と量を決めてあげましょう。
- 食べる量と内容に気をつけて、次の食事に影響がないようにしましょう。
- エネルギーが高く、塩分の多いもの(ポテトチップスなど)はなるべくひかえましょう。
- 菓子類(チョコレートなど)だけでなく、甘い飲み物(ジュース類・乳酸菌飲料・スポーツドリンク等)も食事に影響を与えます。のどがかわいたら水やお茶類をあげましょう。
- 牛乳・果物などいろいろ組み合わせてあげましょう。(P.69 参照)
- おやつは子どもにとって大きな楽しみであり、心を豊かにし、気分転換にもなります。

お菓子の与え過ぎは、こんな悪循環を招きます

