

薬品名	簡易懸濁法	備考
アジルバ錠 20mg	50℃以下で	マクロゴール含有
アスピリン末	OK	分散性やや悪い
アセトアミノフェン錠 200mg	OK	
アゼルニジピン錠 8mg	破壊する	
アゼセミド錠 30mg	50℃以下で	マクロゴール含有
アタラックス-Pcap 25mg	OK	多めの水で洗浄
アーチスト錠 1.25mg	OK	
アテノロール錠 25mg	50℃以下で	マクロゴール含有
アデホス顆粒 100mg/P	不適	腸溶性 懸濁しない
アーテン錠 2mg	OK	
アドナ錠 30mg	OK	
アトルバスタチン錠 10mg	50℃以下で	マクロゴール含有
アボルブカプセル 0.5mg	不適	カプセル残渣が残る 油状成分 経皮吸収性あり
アマンタジン錠 50mg	破壊する・50℃以下で	細かく砕き多めの水で洗浄 マクロゴール含有
アミオダロン塩酸塩錠 100mg	OK	
アミティーザcap 24 μg	単独投与・50℃以下で	熱湯、アルカリ性で含量低下
アミノバクト配合顆粒 4.74g/P	不適	経管チューブを閉塞(顆粒を粉碎後懸濁しても不可)
2.5mgアムロジピンOD錠	OK	口腔内崩壊錠
5mgアムロジピンOD錠	OK	口腔内崩壊錠
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg	OK	
アモキシシリンcap 250mg	OK	
アリナミンF錠 25mg	破壊する	
アルドメット錠 250mg	単独投与・破壊する	アルカリで黒変 多めの水ですこしずつ洗浄
アルファカルシドールcap 0.5 μg	OK	油状内容物 よく洗う
アルプラゾラム錠 0.4mg	OK	
アレビアチン錠 100mg	OK	
アレンドロン酸錠 35mg	OK	粘膜刺激性あり
アローゼン顆粒 0.5g/P	14Fr.以上で可	懸濁後も粒子残る

薬品名	簡易懸濁法	備考
アロプリノール錠 100mg	OK	
アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg	OK	
10mgイグザレルト錠	50℃以下で	マクロゴール含有
15mgイグザレルト錠	50℃以下で	マクロゴール含有
250mgイーケプラ錠	破壊する・50℃以下で	マクロゴール含有
500mgイーケプラ錠	破壊する・50℃以下で	マクロゴール含有
イスコチン錠 100mg	OK	
一硝酸イソソルビド錠 10mg	OK	
イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg	OK	
ウブレチド錠 5mg	単独投与	アルカリで分解しやすい
ウルソデオキシコール酸錠 100mg	OK	
エクセグラン錠 100mg	50℃以下で	マクロゴール含有
エサンブトール錠 250mg	不適	潮解性
エチゾラム錠 0.5mg	50℃以下で	マクロゴール含有
エディロールcap 0.75 μg	不適	油状内容物 成分量少ない
エナラート錠 5mg	OK	
エパデールS 900mg	単独投与	油状内容物
エパルレスタット錠 50mg	破壊する	
エピナスチン塩酸塩錠 20mg	50℃以下で	マクロゴール含有
エビリファイ錠 3mg	OK	
エフピーOD錠 2.5mg	OK	口腔内崩壊錠
エブランチルcap 15mg	14Fr.以上で可	崩壊時間短く 良く洗い流す
エリキユース錠 2.5mg	OK	
L-アスパラギン酸Ca錠 200mg	OK	
エレトリプタン錠 20mg	OK	
塩化ナトリウム	OK	
塩酸プロピペリン錠 10mg	50℃以下で	マクロゴール含有
オーグメンチン配合錠RS 250mg	破壊する・50℃以下で	細かく破壊 吸湿性高い マクロゴール含有

薬品名	簡易懸濁法	備考
オランザピンOD錠 2.5mg	OK	口腔内崩壊錠
オルメサルタンOD錠 20mg	OK	口腔内崩壊錠
オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg	単独投与	アルカリに不安定 口腔内崩壊錠
ガスコン錠 40mg	OK	多めの水で洗浄
ガバペン錠 200mg	不適	崩壊しない シロップに変更
カプトプリル錠 12.5mg	OK	
カモスタットメシル酸塩錠 100mg	単独投与・破壊する	アルカリ性で分解
カリメート経口液20% 25g/P	OK	通過しづらい場合は、若干の水で薄めて投与
カリメート散 5g/P	OK	2.5gを20mLで懸濁し、すぐに注入 崩壊時間短く
カルバマゼピン錠 100mg	OK	
カルベジロール錠 10mg	50℃以下で	マクロゴール含有
カルボシステイン錠 250mg	破壊する	
カンデサルタンOD錠 4mg	OK	口腔内崩壊錠
クエチアピン錠 25mg	50℃以下で	マクロゴール含有
クエン酸第一鉄Na錠 50mg	50℃以下で	マクロゴール含有
クエンメット配合錠	破壊する・50℃以下で	細かく碎き多めの水で洗浄 マクロゴール含有
クラリスロマイシン錠 200mg	OK	
グリチロン配合錠	破壊する	
0.5mgグリメピリド錠	OK	
1mgグリメピリド錠	OK	
グルコンサンK細粒 4mEq/P	OK	
クロチアゼパム錠 5mg	単独投与・50℃以下で	多めの水で洗浄 強酸・アルカリで不安定 マクロゴール含有
25mgクロピドグレル錠	破壊する・50℃以下で	浮遊物あるが通過性問題ない マクロゴール含有
75mgクロピドグレル錠	破壊する・50℃以下で	浮遊物あるが通過性問題ない マクロゴール含有
コデインリン酸塩散 10mg/g	OK	
コートリル錠 10mg	OK	
コルヒチン錠 0.5mg	OK	
五苓散 ツムラー-17 2.5g/P	OK	

薬品名	簡易懸濁法	備考
柴苓湯 ツムラ-114 3g/P	OK	
サインバルタcap 20mg	不適	カプセル内容物が腸溶性顆粒 顆粒は水に浮くため、チューブが閉塞
サムスカ錠 7.5mg	OK	
サルポグレラート塩酸塩錠 50mg	50℃以下で	多めの水で洗浄 マクロゴール含有
酸化マグネシウム	不適	2g以上で閉塞、少量なら14Fr.以上で通過 マグミット錠へ変更
ジクロフェナクNa錠 25mg	50℃以下で	マクロゴール含有
ジスロマック錠 250mg	OK	
ジソピラミドcap 50mg	OK	
シナール配合顆粒 1g/P	OK	
ジピリダモール錠 25mg	50℃以下で	マクロゴール含有
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg	50℃以下で	マクロゴール含有
シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg	50℃以下で	マクロゴール含有
芍薬甘草湯 ツムラ-68 2.5g/P	OK	懸濁後も粒子残るが投与可能
ジャディアンズ錠 10mg	50℃以下で	マクロゴール含有
ジャヌビア錠 25mg	50℃以下で	マクロゴール含有
ジルチアゼム塩酸塩Rcap 100mg	不適	ディスペンサーから出ない 胃瘻は接合部を通過しない
50mgシロスタゾール錠	OK	
100mgシロスタゾール錠	OK	
ステーブラOD錠 0.1mg	OK	口腔内崩壊錠
スピロラクトン錠 25mg	OK	
スルピリド錠 50mg	50℃以下で	マグコロール含有
スローケー錠 600mg	不適	徐放性
ゼチーア錠 10mg	OK	
セニラン錠 2mg	OK	
セパミット-R細粒 10mg/P	OK	分散性悪い 崩壊時間短く
セファレキシシン錠 250mg	50℃以下で	マグコロール含有
セララ錠 50mg	50℃以下で	やや懸濁しにくい 塊が残るので注意 マグコロール含有
セルシン錠 5mg	OK	

薬品名	簡易懸濁法	備考
セルトラリンOD錠 25mg	OK	口腔内崩壊錠
セレコックス錠 100mg	破壊する	
センノシド錠 12mg	破壊する	直前に破壊（吸湿性あるため）
ゾピクロン錠 7.5mg	50℃以下で	多めの水で洗浄 マクロゴール含有
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg	OK	口腔内崩壊錠
ダイアモックス錠 250mg	OK	
大建中湯 ツムラ-100 2.5g/P	OK	
タケキャブ錠 10mg	50℃以下で	マグコロール含有
タミフルcap 75mg	OK	
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg	OK	口腔内崩壊錠 崩壊後は速やかに使用
ダラシンcap 150mg	OK	
タルチレリンOD錠 5mg	OK	口腔内崩壊錠
炭酸水素ナトリウム	OK	
ダントリウムcap 25mg	OK	
タンナルビン末	OK	分散性悪い
タンボコール錠 50mg	単独投与	アルカリに不安定
チアプリド錠 25mg	破壊する・50℃以下で	懸濁後も粒子残る マクロゴール含有
チクロピジン塩酸塩錠 100mg	50℃以下で	マクロゴール含有
チザニジン錠 1mg	OK	アルカリで黄変するが、薬効には問題ない
チラーヂンS錠 50 $\mu$ g	OK	
つくしA・M配合散 1.3g/P	OK	
テオフィリンDS 200mg/g	OK	
デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠 15mg	OK	
テトラミド錠 10mg	50℃以下で	マクロゴール含有
テネリア錠 20mg	破壊する・50℃以下で	マクロゴール含有
デパケンR錠 200mg	不適	徐放性 バルプロ酸ナトリウム細粒に変更
テプレノンcap 50mg	50℃以下で	多めの水で洗浄 強酸で分解 マクロゴール含有
テルペラン錠 5mg	50℃以下で	マクロゴール含有

薬品名	簡易懸濁法	備考
テルミサルタン錠 20mg	破壊する・50℃以下で	マクロゴール含有
トアラセット配合錠	50℃以下で	マクロゴール含有
1mgドキサゾシン錠	OK	
2mgドキサゾシン錠	OK	速崩錠
トコフェロールニコチン酸エステルcap 100mg	OK	
ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg	OK	口腔内崩壊錠
ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg	OK	口腔内崩壊錠
トラゼンタ錠 5mg	50℃以下で	マクロゴール含有
トラゾドン塩酸塩錠 25mg	破壊する・50℃以下で	マクロゴール含有
トラネキサム酸錠 250mg	OK	
トラベルミン配合錠	破壊する・50℃以下で	マクロゴール含有
トラマールOD錠 50mg	OK	口腔内崩壊錠
トリアゾラム錠 0.125mg	OK	速崩錠
トリクロルメチアジド錠 1mg	OK	
トリプタノール錠 10mg	OK	
ドロキシドパcap 100mg	単独投与	アルカリで黒変 投与後よく洗う
ドンペリドン錠 10mg	破壊する・50℃以下で	マクロゴール含有
ナフトピジルOD錠 25mg	OK	口腔内崩壊錠
ニコランジル錠 5mg	OK	
ニセルゴリン錠 5mg	破壊する・50℃以下で	マクロゴール含有
ニトラゼパム錠 5mg	OK	
ニトロペン舌下錠 0.3mg	不適	舌下錠 ミオコールスプレーに変更
ニフェジピンCR錠 20mg	不適	徐放性 セパミット-R細粒に変更
乳糖水和物	OK	
ネオドパストン配合錠L 100mg	単独投与	アルカリで黒変 投与後よく洗う
ネキシウムcap 20mg	10Fr.以上で可	多めの水で洗浄 脱カップで8Fr.可
ノイロトロピン錠 4U	OK	
ノウリアスト錠 20mg	50℃以下で	マクロゴール含有

薬品名	簡易懸濁法	備考
ノバミン錠 5mg	50℃以下で	マクロゴール含有
バイアスピリン錠 100mg	不適	腸溶性 アスピリン末に変更
バクタ配合錠	OK	
ハーフジゴキシン錠 0.125mg	OK	
バラシクロビル粒状錠 500mg	破壊する	ゲル化粒状錠 スティック包装の上から軽くたいてから懸濁
バルプロ酸ナトリウム細粒	OK	
パロキセチン錠 10mg	OK	
半夏厚朴湯 ツムラ-16 2.5g/P	単独投与	アルカリで緑変、酸で赤変 投与後よく洗う
バンコマイシン塩酸塩散 0.5g	OK	
ピーエイ配合錠	破壊する	
ピオグリダゾンOD錠 15mg	OK	口腔内崩壊錠
ビカルタミド錠 80mg	破壊する・50℃以下で	マクロゴール含有
ピコスルファートNa錠 2.5mg	OK	
ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg	破壊する	
ピタバスタチンCa錠 2mg	50℃以下で	マクロゴール含有
ビタメジン配合capB 25mg	OK	
ピドキサール錠 20mg	不適	腸溶性
ビムパット錠 50mg	50℃以下で	マクロゴール含有
ピルシカイニド塩酸塩cap 25mg	OK	
ファモチジンD錠 10mg	OK	口腔内崩壊錠
2mgフィコンパ錠	50℃以下で	マクロゴール含有
4mgフィコンパ錠	50℃以下で	マクロゴール含有
フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg	50℃以下で	マクロゴール含有
フェノバル錠 30mg	OK	
フェノバル散 100mg/g	OK	
フェブリク錠 20mg	50℃以下で	マクロゴール含有
フェンラーゼ配合cap	OK	
フォリアミン錠 5mg	OK	

薬品名	簡易懸濁法	備考
75mgプラザキサcap	不適	体内動態変わる
110mgプラザキサcap	不適	体内動態変わる
フラジール内服錠 250mg	破壊する	できるだけ細かく砕く 残渣多いため慎重に
プラバスタチンNa錠 10mg	OK	
0.325mgプラミペキソール塩酸塩LA錠MI	不適	徐放性
1.5mgプラミペキソール塩酸塩LA錠MI	不適	徐放性
プランルカスト錠 112.5mg	OK	
フルコナールcap 100mg	OK	
フルニトラゼパム錠 1mg	50℃以下で	懸濁液は青色に着色 マクロゴール含有
フルバスタチン錠 20mg	50℃以下で	マクロゴール含有
50mgプレタールOD錠	OK	口腔内崩壊錠
100mgプレタールOD錠	OK	口腔内崩壊錠
1mgプレドニゾン錠	OK	
5mgプレドニゾン錠	OK	
フロセミド錠 10mg	OK	
ブロチゾラム錠 0.125mg	OK	
ブロチゾラムOD錠 0.25mg	OK	口腔内崩壊錠
フロリネフ錠 0.1mg	OK	
ベサコリン散 50mg/g	OK	
ベザフィブラートSR錠 200mg	不適	徐放性
ベシケアOD錠 2.5mg	50℃以下で	口腔内崩壊錠 マクロゴール含有
ベタニス錠 25mg	不適	徐放性
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg	OK	
ベニジピン塩酸塩錠 4mg	50℃以下で	完全に崩壊しないためよく振り混ぜる マクロゴール含有
ベラプロストNa錠 20 μg	50℃以下で	マクロゴール含有
ベリチーム配合顆粒 1g/P	不適	ディスペンサーに入らない
ペルゴリド錠 50 μg	OK	
ベルソムラ錠 15mg	破壊する	



薬品名	簡易懸濁法	備考
ベンズブロマロン錠 50mg	OK	
ボグリボース錠 0.2mg	OK	
補中益気湯 ツムラ-41 2.5g/P	OK	懸濁後も粒子残るが投与可能
ポラプレジックOD錠 75mg	OK	口腔内崩壊錠 残渣が沈殿しやすい 多めの水で洗浄
ポララミン錠 2mg	OK	
ホリゾン錠 2mg	OK	
マグミット錠 330mg	OK	速崩錠
ミオナベース錠 50mg	単独投与・破壊する	アルカリに不安定のため単独投与
ミドドリン塩酸塩錠 2mg	OK	
ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg	OK	
ミノドロン酸錠 50mg	50℃以下で	粘膜刺激性 マクロゴール含有
ミヤBM錠 20mg	OK	
ミルタザピンOD錠 15mg	OK	口腔内崩壊錠
メインテート錠 0.625mg	破壊する・50℃以下で	マクロゴール含有
メキシレチン塩酸塩錠 50mg	破壊する・50℃以下で	マクロゴール含有
メスチノン錠 60mg	OK	
メチコバイド錠 500 μg	50℃以下で	マクロゴール含有
メトグルコ錠 250mg	破壊する・50℃以下で	マクロゴール含有
メトトレキサートcap 2mg	OK	シリンジとチューブに若干残渣の付着あるため 多めの水で洗浄
5mgメモリーOD錠	OK	口腔内崩壊錠
20mgメモリーOD錠	OK	口腔内崩壊錠
メルカゾール錠 5mg	粉碎	崩壊しない 粉碎可
メロキシカム錠 5mg	OK	
モサプリドクエン酸塩錠 5mg	OK	
モンテルカスト錠 10mg	破壊する・50℃以下で	マクロゴール含有
ユニフィルLA錠 100mg	不適	徐放性
ユービット錠 100mg	50℃以下で	マクロゴール含有
ユリーフ錠 2mg	OK	

薬品名	簡易懸濁法	備考
ヨウ化カリウム	OK	
抑肝散 ツムラ-54 2.5g/P	OK	
ラシックス錠 20mg	OK	
ラニラピッド錠 0.1mg	OK	
ラミクターール錠 25mg	OK	速崩錠
ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg	50℃以下で	マクロゴール含有
ランソプラゾールOD錠 15mg	50℃以下で	口腔内崩壊錠 マクロゴール含有
リオレサール錠 5mg	OK	
リクシアナOD錠 60mg	OK	口腔内崩壊錠
リスペリドン錠 1mg	50℃以下で	マクロゴール含有
六君子湯 ツムラ-43 2.5g/P	OK	
リネゾリド錠 600mg	単独投与・50℃以下で	マクロゴール含有
リファンピシンcap 150mg	OK	
リボトリール錠 0.5mg	OK	
リマプロストアルファデクス錠 5 $\mu$ g	破壊する	15分放置で完全崩壊 長めに放置
25mgリリカOD錠	OK	口腔内崩壊錠
75mgリリカOD錠	OK	口腔内崩壊錠
ルネスタ錠 2mg	50℃以下で	マクロゴール含有
2mgレキップCR錠	不適	徐放性
8mgレキップCR錠	不適	徐放性
レバミピド錠 100mg	50℃以下で	マクロゴール含有
レボトミン錠 5mg	50℃以下で	マクロゴール含有
250mgレボフロキサシン粒状錠	破壊する・50℃以下で	ゲル化粒状錠 スティック包装の上から軽くたいてから懸濁 マクロゴール含有
500mgレボフロキサシン粒状錠	破壊する・50℃以下で	ゲル化粒状錠 スティック包装の上から軽くたいてから懸濁 マクロゴール含有
4mgレミニールOD錠	OK	口腔内崩壊錠
12mgレミニールOD錠	OK	口腔内崩壊錠
ロキソプロフェン錠 60mg	破壊する	
ロスバスタチンOD錠 2.5mg	OK	口腔内崩壊錠

薬品名	簡易懸濁法	備考
ロゼレム錠 8mg	OK	
ロトリガ粒状cap 2g	不適	油状成分 チューブ内に沈着する
ロフラゼブ酸エチル錠 1mg	OK	
ロペラミド錠 1mg	OK	速崩錠
ロラゼパム錠 0.5mg	OK	
ロラタジンOD錠 10mg	OK	口腔内崩壊錠
ワソラン錠 40mg	破壊する・50℃以下で	マクロゴール含有
ワーファリン錠 1mg	OK	
ワルファリンカリウム錠 0.5mg	OK	